

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia Responsabile Dott. P. Di Emidio	Nota MAXILLO FACCIALE nota 37 <u>Revisione 2 del 13.12.2021</u> Numero pagine 3
--	---	---

Trattamento/Intervento di Protesi Dentale Mobile

Gent.le Sig.re/r

Qui di seguito vogliamo darLe informazioni sul trattamento che è stato consigliato e sulle possibili alternative. Tali informazioni hanno carattere generale e servono ad integrare quelle che le saranno fornite dal Medico, anche in relazione alla sua specifica condizione.

Descrizione dello stato clinico del paziente

- ☐ edentulia parziale (mancanza di alcuni elementi dentali in una o entrambe le arcate)
- ☐ edentulia totale (mancanza di tutti i denti in una o entrambe le arcate)

Descrizione del trattamento

Protesi mobile parziale: Applicazione di una protesi mobile con appoggio mucoso e su elementi dentali residui. Può essere di resina con ganci metallici o presentare un'armatura metallica = scheletrato

Protesi mobile totale: Applicazione di protesi mobile con appoggio sulla sola mucosa orale (è di sola resina)

Tali protesi vengono costruite su modelli derivati da impronte rilevate sul paziente generalmente in ambulatorio, in casi eccezionali a domicilio dello stesso. Sono necessarie varie sedute di impronte e prove, per realizzare il manufatto protesico definitivo. Sicuramente, a domicilio, la procedura può risultare più lunga e indaginosa per l'impossibilità da parte del dentista di avere a disposizione tutta la strumentazione meccanica utile.

Materiale di costruzione: resina acrilica, denti del commercio o personalizzati in resina, leghe in cromocobalto, filo rotondo in acciaio ; questi materiali possono avere in soggetti predisposti effetti allergizzanti a breve o a lungo termine.

Rischi, complicanze, effetti collaterali

L'appoggio mucoso della protesi può provocare nel tempo un incremento del riassorbimento osseo delle creste alveolari del mascellare superiore ed inferiore. A causa di ciò, soprattutto nella mandibola, si possono presentare dolori di tipo nevralgico dovuti a superficializzazione delle strutture nervose.

Le complicazioni derivanti da queste protesi possono essere numerose, ma nella maggior parte dei casi non particolarmente rilevanti. Si possono avere lesioni mucose da decubito, dolenzia degli elementi dentali portanti gli appoggi della protesi parziale, maggior sensibilità degli stessi alla carie ed ai problemi parodontali. L'instabilità della protesi totale rappresenta il problema più sentito ed è spesso collegata a situazioni anatomiche e funzionali del paziente anche variabili nel tempo. Uno scorretto uso delle protesi mobili, in particolare un'igiene orale insufficiente, può provocare infezione delle mucose orali. Nei portatori di protesi mobile sono descritti rarissimi casi di patologie tumorali a carico delle mucose orali.

In caso di crisi convulsive / epilettiche le protesi possono danneggiarsi e si possono distaccare denti o parti della resina (nei pazienti a rischio, pertanto, è consigliato l'uso delle protesi solo per i pasti).

Si consiglia di porre particolare attenzione ad eventuali piccole o grandi fratture della resina che potrebbero comportare lesioni mucose con rischio di traumi continuativi e ferite

Benefici previsti

La protesi mobile permette il ripristino delle funzione masticatoria, fonatoria e ove possibile dell'aspetto estetico.

Conseguenze in caso di rifiuto del trattamento

Possibile compromissione dell'apparato stomatognatico, della funzione masticatoria, fonatoria ed estetica. Nel caso siano presenti alcuni elementi dentari, il non posizionamento di una protesi comporta un maggior e non adeguato carico di lavoro per tutti i denti residui accelerandone la perdita

Alternative terapeutiche

Dove è possibile può essere realizzata una protesi fissa tradizionale oppure una protesi fissa su impianti o una protesi mista (in parte fissa, in parte mobile). In certi casi la chirurgia impiantare risolve in maniera soddisfacente i problemi legati alla mobilità del manufatto protesico anche nei casi di edentulia completa. Queste soluzioni alternative al momento non sono attuabili presso questa ASL.

Il trattamento proposto richiede la seguente procedura anestesologica Il

trattamento di protesi mobile non richiede l'uso di anestesia locale.

Leggere attentamente e/o seguire le istruzioni date dal medico per la condotta post-operatoria **Note aggiuntive**

Test di verifica della qualità del foglio informativo

Ritiene che le informazioni che le sono state fornite con questo opuscolo siano sufficienti e chiare?

SI

☐

NO

☐

Vorrebbe avere altre informazioni ?

(qualora le informazioni non siano sufficienti o chiare indicare se possibile su quale argomento e attendere il colloquio con il medico)

FIRMA DEL PAZIENTE _____

Data ____/____/____

FIRMA DEL MEDICO _____ Data ____/____/____
